


FACTEURS ASSOCIÉS AU VAPOTAGE CHEZ LES ADOS & LES JEUNES ADULTES

Étude longitudinale de 752 adolescents/jeunes adultes au Manitoba

Janique Fortier, Julie-Anne McCarthy, Tamara Taillieu, Samantha Salmon, Ashley Stewart-Tufescu, Isabel Garcés Dávila, Harriet L. MacMillan, Jitender Sareen, Lil Tonmyr, Marni Brownell, Nathan C. Nickel, & Tracie O. Afifi



LA PRÉVALENCE DU VAPOTAGE

Ces résultats démontrent l'importance de la prévention précoce.



89 % DES ADOLESCENTS QUI VAPOTAIENT LORS DE LA 1ÈRE VAGUE, VAPOTAIENT TOUJOURS ENVIRON 1(+)⁺ ANNÉE PLUS TARD



Lire le code pour l'étude au complet

Ces expériences négatives au cours de l'enfance et ces facteurs de risque identifiés dans l'étude peuvent aider à développer des programmes et stratégies et cibler certains groupes pour des interventions reliées au vapotage.

FACTEURS ASSOCIÉS AVEC UNE PROBABILITÉ ACCRUE DE VAPOTAGE*

*Vapoter à n'importe quel point, Vague 1 seulement, Vague 2 seulement et/ou continuellement



Placement en famille d'accueil ou contact avec organisme de protection



Parents séparés ou divorcés



Troubles de santé mentale chez les ados ou à domicile



Abus & négligence émotionnels



Troubles avec la police chez les parents



Exposé à la violence verbale entre parents/adultes



Consommation de substances par membre(s) du domicile



Victimisation par les pairs



Quartier dangereux



Parents qui s'adonnent au jeu



Parents fument/vapotent